

Estimades famílies,

La grip és una malaltia provocada per un virus, transmessa de persona a persona per gotetes al tossir i esternudar.

La vacunació ajuda a mantindre els seus fills sans i protegits davant de la grip. Com més persones es vacunen, menys possibilitats hi ha que la grip es transmeta.

La vacunació de la grip ha de realitzar-se anualment, ja que el virus és capaç de canviar cada any, i les nostres defenses necessiten aprendre a reconèixer-lo i actuar correctament per a inactivar-lo.

Les reaccions adverses que en algun cas poden observar-se després de la vacunació intranasal són, en general, lleus i de curta duració com nas congestionat i amb mocs, i mal de cap.

La vacunació en població infantil ha demostrat evitar casos greus de malaltia i hospitalització en totes les edats.

Des de la Conselleria de Sanitat i la Conselleria d'Educació estem treballant conjuntament amb l'objectiu de realitzar la vacunació de la grip en els centres docents als xiquets que cursen **1r i 2n d'Educació Infantil**.

Ens dirigim a vostés amb la intenció de proporcionar-los tota la informació necessària per a la vacunació davant de la grip que es realitzarà en els centres docents en la campanya 2024-2025.

La vacunació en el centre docent es realitzarà mitjançant la vacuna Fluenz® **INTRANASAL** que consistix a administrar 0,1ml de líquid en cada fossa nasal. La vacunació es realitzarà per professionals sanitaris del centre de salut amb el qual està coordinat el col·legi, que es traslladaran al centre docent per a realitzar la vacunació.

La vacunació en centres docents és opcional, té com a objectiu facilitar la vacunació per a tots els xiquets nascuts entre 2020 i 2021, i millora l'accessibilitat a la prevenció d'esta malaltia.

Al començament del curs escolar des del seu centre docent li facilitaran informació sobre com i quan es realitzarà esta vacunació i tota la informació complementària al respecte (full informatiu, autoritzacions, etc.). En aquelles situacions especials per l'existència de determinades patologies o contraindicació de la vacuna intranasal podrà contactar amb el seu centre de salut. Per a més informació pot consultar en la web de la Conselleria de Sanitat i la Conselleria d'Educació.

Agraïm la seua atenció i col·laboració.

**SECRETARI AUTONÒMIC D'EDUCACIÓ**

Firmado por Daniel McEvoy Bravo, el  
02/09/2024 12:00:45  
Cargo: Secretario Autonómico de Educación



**SECRETÀRIA AUTONÒMICA DE SANITAT**

Firmat per Begoña Comendador Jimenez, el  
02/09/2024 11:00:48  
Càrrec: Secretaria Autonómica Sanidad



Estimadas familias,

La gripe es una enfermedad provocada por un virus, transmitida de persona a persona por gotitas al toser y estornudar.

La vacunación ayuda a mantener a sus hijos sanos y protegidos frente a la gripe. Cuantas más personas se vacunen, menos posibilidades hay de que la gripe se transmita.

La vacunación frente a la gripe debe realizarse anualmente, ya que el virus es capaz de cambiar cada año, y nuestras defensas necesitan aprender a reconocerlo y actuar correctamente para inactivarlo.

Las reacciones adversas que en algún caso pueden observarse después de la vacunación intranasal son, por lo general, leves y de corta duración como: nariz congestionada y con mocos, y dolor de cabeza.

La vacunación en población infantil ha demostrado evitar casos graves de enfermedad y hospitalización en todas las edades.

Desde la Conselleria de Sanidad y la Conselleria de Educación estamos trabajando juntamente con el objetivo de realizar la vacunación de la gripe en los centros docentes a los niños que cursen **1º y 2º de educación infantil**.

Nos dirigimos a ustedes con la intención de proporcionarles toda la información necesaria para la vacunación frente a la gripe que se realizará en los centros docentes en la campaña 2024/25.

La vacunación en el centro docente se realizará mediante la vacuna Fluenz® **INTRANASAL** que consiste en administrar 0,1ml de líquido en cada fosa nasal. La vacunación se realizará por profesionales sanitarios del centro de salud con el que está coordinado el colegio, que se trasladarán al centro docente para realizar la vacunación.

La vacunación en centros docentes siendo opcional, tiene como objetivo facilitar la vacunación para todos los niños nacidos entre 2020 y 2021, mejorando la accesibilidad a la prevención de esta enfermedad.

Al comienzo del curso escolar desde su centro docente le facilitarán información sobre cómo y cuándo se va a realizar esta vacunación y toda la información complementaria al respecto (hoja informativa, autorizaciones, etc.). En aquellas situaciones especiales por la existencia de determinadas patologías o contraindicación de la vacuna intranasal podrá contactar con su Centro de Salud. Para más información puede consultar en la web de la Conselleria de Sanidad y la Conselleria de Educación.

Agradeciendo de antemano su atención y colaboración.

**SECRETARIO AUTONÓMICO DE EDUCACIÓN**

Firmado por Daniel McEvoy Bravo, el  
02/09/2024 12:00:45  
Cargo: Secretario Autonómico de Educación

**SECRETARIA AUTONÓMICA DE SANIDAD**

Firmat per Begoña Comendador Jimenez, el  
02/09/2024 11:00:53  
Càrrec: Secretaria Autonómica Sanidad

## BENEFICIS, SEGURETAT I EFECTES ADVERSOS

La població infantil juga un paper important en la transmissió del virus de la grip. La vacunació és una estratègia de prevenció essencial per a la seu protecció directa, ja que els més xicotets tenen més incidència de grip i més risc de complicacions com la pneumònia secundària, l'hospitalització i la mort causada per la grip.

Igualment, la vacunació produeix un impacte indirecte per aconseguir la protecció de les persones del seu entorn, ja que es redueix el risc de contagi. S'ha demostrat que la vacunació en la infància redueix les consultes als serveis d'urgència i hospitalitzacions per grip en la població general.

S'estima que la vacunació universal en la infància reduiria la incidència de grip en més d'un 20 % en el total de la població i que la vacunació pot reduir 7 de cada 10 hospitalitzacions degudes a la grip en xiquets.

L'administració intranasal representa un benefici clar per a la vacunació infantil en centres docents. És una administració molt ben acceptada i tolerada tant pels progenitors com pels xiquets i xiquetes, ja que s'evita una punxada a la qual moltes persones tenen por.

L'autorització de qualsevol medicament, incloses les vacunes, es basa en assajos clínics i en l'autorització posterior de les agències reguladores dels medicaments, que en el cas d'esta vacuna és l'EMA (Agència Europea de Medicaments). Hi ha una evaluació de l'eficàcia contínua, informes periòdics d'acord amb la normativa europea, que aporten una gran seguretat en l'ús de la vacuna intranasal i una molt bona relació benefici-risc per a la població objectiu.

La vacuna intranasal es pot administrar en població infantil i adolescent des dels 24 mesos fins als 18 anys i és una vacuna molt segura, com ho demostren els milions de dosis administrades des que es comercialitza.

La vacuna intranasal de la grip és una vacuna de virus vius atenuats i té potencial de transmissió a contactes de persones **immunodeprimides**. Els receptors de la vacuna han d'intentar evitar, en la mesura del que siga possible, el contacte estret amb persones greument immunodeprimides (p. ex., receptors de trasplantaments de medul·la òssia que requerixen aïllament) durant 1-2 setmanes després de la vacunació.

La vacuna intranasal no ha d'administrar-se a xiquets i adolescents amb asma greu o sibilànies actives, ja que estos individus no han sigut estudiats correctament en els assajos clínics.

Les reaccions adverses més freqüents en els estudis clínics realitzats i arreplegades en la fitxa tècnica de la vacuna intranasal són la congestió nasal/rinorrea, disminució de l'appetit, malestar, cefalea, debilitat, miàlgia i pirèxia.

Habitualment, les reaccions adverses que en algun cas poden observar-se després de la vacunació intranasal són, en general, lleus i de curta duració, com ara: nas congestionat i amb mocs, i mal de cap.

## BENEFICIOS, SEGURIDAD Y EFECTOS ADVERSOS

La población infantil juega un papel importante en la transmisión del virus de la gripe, siendo la vacunación una estrategia de prevención esencial para su protección directa, ya que los más pequeños tienen una mayor incidencia de gripe y un mayor riesgo complicaciones como la neumonía secundaria, hospitalización y muerte causada por la gripe.

Igualmente, la vacunación produce un impacto indirecto al conseguir la protección de las personas de su entorno, ya que se reduce el riesgo de contagio. Se ha demostrado que la vacunación en la infancia reduce las consultas a los servicios de urgencia y hospitalizaciones por gripe en la población general.

Se estima que la vacunación universal en la infancia reduciría la incidencia de gripe en más de un 20% en el total de la población y que la vacunación puede reducir 7 de cada 10 hospitalizaciones debidas a gripe en niños.

La administración intranasal representa un claro beneficio para la vacunación infantil en centros docentes, siendo una administración muy bien aceptada y tolerada tanto por los progenitores como por los niños/as ya que se evita el pinchazo al que muchas personas tienen miedo.

La autorización de cualquier medicamento, incluidas las vacunas, se basa en ensayos clínicos y en la autorización posterior por las agencias reguladoras de los medicamentos que en el caso de esta vacuna es la EMA (Agencia Europea del Medicamento). Existe una evaluación de eficacia continua, informes periódicos conforme a normativa europea, que aportan una gran seguridad en el uso de la vacuna intranasal y una muy buena relación beneficio-riesgo para la población objetivo.

La vacuna intranasal se puede administrar en población infantil y adolescente desde los 24 meses hasta los 18 años y es una vacuna muy segura como lo demuestra los millones de dosis administradas desde que se comercializó.

La vacuna intranasal de la gripe es una vacuna de virus vivos atenuados y tiene potencial de transmisión a contactos de personas **inmunodeprimidas**. Los receptores de la vacuna deben intentar evitar, en lo posible, el contacto estrecho con personas gravemente inmunodeprimidas (p. ej., receptores de trasplantes de médula ósea que requieren aislamiento) durante 1-2 semanas después de la vacunación.

La vacuna intranasal no debe administrarse a niños y adolescentes con asma grave o sibilancias activas ya que estos individuos no han sido estudiados correctamente en los ensayos clínicos.

Las reacciones adversas más frecuentes en los estudios clínicos realizados y recogidas en la ficha técnica de la vacuna intranasal son la congestión nasal/rinorrea, disminución del apetito, malestar, cefalea, debilidad, mialgia y pirexia.

Habitualmente las reacciones adversas que en algún caso pueden observarse después de la vacunación intranasal son, por lo general, leves y de corta duración como: nariz congestionada y con mocos, y dolor de cabeza.

## FULL INFORMATIU PARES, MARES I TUTORS/TUTORES

La grip és una malaltia infecciosa molt freqüent (especialment en la infància), que causa un nombre significativament elevat d'hospitalitzacions, visites mèdiques i consum d'antibiòtics en la població infantil. Les complicacions més freqüents són sobretot respiratòries, com l'obstrucció bronquial i la pneumònica, i també l'otitis mitjana aguda. Altres complicacions poc freqüents, com encefalitis o miocarditis, poden ser greus, especialment en xiquets amb factors de risc o malalties cròniques.

La vacunació contra la grip és la mesura més efectiva per a evitar infeccions i, sobretot, els casos més greus. A més, la vacunació infantil també ajuda a protegir les persones del seu entorn, ja que es reduïx el risc de contagi.

**Els equips de vacunació compten amb tot el que és necessari perquè la vacunació en els centres siga tan segura com si es realitzara en el centre de salut.**

Se sol·licita l'autorització de mares/pares/tutors legals per a la vacunació. No es vacunarà cap persona que no compte amb esta.

En el quadre següent s'exposen algunes situacions en les quals no està indicada la vacunació contra la grip amb vacuna INTRANASAL en el centre docent. **En estos casos, pot consultar amb l'equip pediàtric del centre de salut:**

NOM I COGNOMS:	SIP:
MARCAR amb una X SI ÉS EL SEU CAS	SITUACIÓ PERSONAL
	Ha patit alguna reacció al·lèrgica greu a l'ou
	Ha patit alguna reacció al·lèrgica greu a la gentamicina
	Patix immunosupressió: Leucèmies, limfomes, VIH amb símptomes o en tractament amb dosis elevades de corticoesteroides (s'exclouen les cremes/tòpics i inhaladors).
	Està en tractament prolongat amb àcid acetilsalicílic
	Conviu amb persones que tinguen immunosupressió greu
	Patix asma greu o sibilacions actives
	Té antecedents de reacció al·lèrgica greu a esta i/o altres vacunes

Qualsevol informació relacionada amb l'estat de salut està protegida segons el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril (RGPD), i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia de drets digitals (LOPDGDD), i actualitzacions posteriors. La finalitat d'esta informació és exclusivament per al desenrotllament de la campanya de vacunació. En qualsevol cas, els titulars de la pàtria potestat podran exercir en nom i representació dels menors de catorze anys els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició o qualssevol altres que puguen correspondre's en el context de la llei orgànica citada.

Si necessita més informació, pot consultar-la en:

<https://www.sp.san.gva.es/sscc/opciones4.jsp?Idioma=va&perfil=inst&Opcion=VACUNAS&Seccion=SANPS1210102&Nivel=2&MenuSup=SANMS&CodPunto=3507>



Comité Assessor de Vacunes i Immunitzacions de l'AEP. Vacunació contra la grip estacional en la infància i l'adolescència. Recomanacions 2024-2025. AEP [internet]. Juny de 2024. Disponible en:  
<https://vacunasaep.org/documentos/recomendaciones-de-vacunacion-frente-la-gripe-2024-25>



## HOJA INFORMATIVA PADRES/MADRES/TUTORES/AS

La gripe es una enfermedad infecciosa muy frecuente (especialmente en la infancia), que causa un número significativamente elevado de hospitalizaciones, visitas médicas y consumo de antibióticos en la población infantil. Las complicaciones más frecuentes son sobre todo respiratorias, como la obstrucción bronquial y la neumonía, y también la otitis media aguda. Otras complicaciones poco frecuentes, como encefalitis o miocarditis, pueden ser graves, especialmente en niños con factores de riesgo o enfermedades crónicas.

La vacunación frente a la gripe es la medida más efectiva para evitar infecciones y, sobre todo, los casos más graves. Además, la vacunación infantil también ayuda a proteger a las personas de su entorno, ya que se reduce el riesgo de contagio.

**Los equipos de vacunación cuentan con todo lo necesario para que la vacunación en estos centros sea tan segura como si se realizase en el centro de salud.**

Se solicita autorización de madres/padres/tutores legales para la vacunación. No se vacunará a ninguna persona que no cuente con ella.

En el cuadro siguiente se exponen algunas situaciones en las que no está indicada la vacunación frente a la gripe con vacuna INTRANASAL en el Centro Docente, **en estos casos puede consultar con el equipo pediátrico del centro de salud:**

NOMBRE Y APELLIDOS:	SIP:
MARCAR con una X SI ES SU CASO	SITUACIÓN PERSONAL
	Ha padecido reacción alérgica grave al huevo
	Ha padecido reacción alérgica grave a la Gentamicina
	Padece inmunosupresión: Leucemias, linfomas, VIH con síntomas, o en tratamiento con dosis elevadas de corticoesteroides (se excluye las cremas/tópicos e inhaladores).
	Está en tratamiento prolongado con ácido acetilsalicílico
	Convive con personas que tengan inmunosupresión grave
	Padece asma grave o sibilancias activas
	Tiene antecedentes de reacción alérgica grave a ésta y/u otras vacunas

Toda información relacionada con el estado de salud está protegida según lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (RGPD) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales (LOPDGDD) y posteriores actualizaciones. La finalidad de esta información es exclusivamente para el desarrollo de la campaña de vacunación. En cualquier caso, los titulares de la patria potestad podrán ejercitar en nombre y representación de los menores de catorce años los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición o cualesquier otros que pudieran corresponderles en el contexto de la citada ley orgánica

Si necesita más información, puede consultarla en: <a href="http://www.sp.san.gva.es/sscc/opciones4.jsp?CodPunto=3507&amp;Opcion=VACUNAS&amp;MenuSup=SANMS&amp;Nivel=2&amp;Seccion=SANPS1210102">http://www.sp.san.gva.es/sscc/opciones4.jsp?CodPunto=3507&amp;Opcion=VACUNAS&amp;MenuSup=SANMS&amp;Nivel=2&amp;Seccion=SANPS1210102</a>	
Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones de la AEP. Vacunación frente a la gripe estacional en la infancia y la adolescencia. Recomendaciones 2024-2025. AEP[Internet]. Junio 2024. Disponible en: <a href="https://vacunasaep.org/documentos/recomendaciones-de-vacunacion-frente-la-gripe-2024-25">https://vacunasaep.org/documentos/recomendaciones-de-vacunacion-frente-la-gripe-2024-25</a>	

## AUTORIZACIÓN, JUSTIFICANTE Y HOJA INFORMATIVA PARA PADRES/MADRES/TUTORES/AS DE CENTROS DOCENTES DE EDUCACION INFANTIL

La vacunación frente a la GRIPE en la población infantil ha demostrado evitar casos graves de enfermedad y hospitalización para la población vacunada y también para la comunidad en general.

Durante esta temporada 2024-25, en la Comunidad Valenciana, se va a facilitar a las familias el acceso a la vacunación de los niños y niñas de 1º y 2º de educación infantil (nacidos entre 2020 y 2021), desplazándose el equipo sanitario a los centros docentes para la administración de la vacuna en el mismo centro.

La vacuna es intranasal, Fluenz®, y se utiliza colocando una pequeña cantidad (0,1 ml) en cada fosa nasal.

Las reacciones adversas que en algún caso pueden observarse después de la vacunación intranasal son, por lo general, leves y de corta duración como: nariz congestionada y con mocos, y dolor de cabeza.

Si su hijo/a tiene algún problema de salud que contraíndique la vacunación intranasal, indíquelo en la hoja adjunta y si usted prefiere que la vacunación se realice en el centro de salud, debe solicitar cita en el mismo.

Para que su hijo/a reciba la vacuna en el centro docente, es necesario que rellene y firme la siguiente autorización:

---

### AUTORIZACIÓN PARA LA VACUNACIÓN FREnte A LA GRIPE EN EL CENTRO DOCENTE

D./Dª \_\_\_\_\_, con DNI \_\_\_\_\_

como representante legal de:

D. /Dª \_\_\_\_\_, con SIP: \_\_\_\_\_

y fecha de nacimiento \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ (día/ mes /año)

- Autorizo a que se le administre la vacuna INTRANASAL frente a la GRIPE en el colegio.  
 NO autorizo a que se le administre la vacuna INTRANASAL frente a la GRIPE en el colegio.  
 Deseo la vacunación en el centro de salud.

Firma:

Fecha: ...../...../2024

Toda información relacionada con el estado de salud está protegida según lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (RGPD) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales (LOPDGDD) y posteriores actualizaciones. La finalidad de esta información es exclusivamente para el desarrollo de la campaña de vacunación. En cualquier caso, los titulares de la patria potestad podrán ejercitar en nombre y representación de los menores de catorce años los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición o cualesquiera otros que pudieran corresponderles en el contexto de la citada ley orgánica

## AUTORITZACIÓ, JUSTIFICANT I FULL INFORMATIU PER A PARES, MARES I TUTORS/TUTORES DE CENTRES DOCENTS D'EDUCACIÓ INFANTIL

La vacunació contra la GRIP en la població infantil ha demostrat evitar casos greus de malaltia i hospitalització per a la població vacunada i també per a la comunitat en general.

Durant esta temporada 2024-2025, a la Comunitat Valenciana es facilitarà a les famílies l'accés a la vacunació dels xiquets i xiquetes de 1r i 2n d'Educació Infantil (nascuts entre 2020 i 2021). L'equip sanitari es desplaçarà als centres docents per a l'administració de la vacuna en el mateix centre.

La vacuna és intranasal, Fluenz®, i s'utilitza amb la col·locació d'una quantitat xicoteta (0,1 ml) en cada fossa nasal.

Les reaccions adverses que en algun cas poden observar-se després de la vacunació intranasal són, en general, lleus i de curta duració, com ara: nas congestionat i amb mocs, i mal de cap.

Si el seu fill/a té algun problema de salut que contraindique la vacunació intranasal, indique-ho en el full adjunt. Si vosté preferix que la vacunació es realitze en el centre de salut, ha de sol·licitar la cita en este.

Perquè el seu fill/a reba la vacuna en el centre docent, és necessari que ompliga i firme l'autorització següent:

---

### AUTORITZACIÓ PER A LA VACUNACIÓ CONTRA LA GRIP EN EL CENTRE DOCENT

Sr./Sra. \_\_\_\_\_, amb \_\_\_\_\_ DNI

com a representant legal de:

Sr./Sra. \_\_\_\_\_, amb SIP: \_\_\_\_\_

i data de naixement \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ (dia/mes/any)

- Autoritze que se li administre la vacuna INTRANASAL contra la GRIP en el col·legi.  
 NO autoritze que se li administre la vacuna INTRANASAL contra la GRIP en el col·legi.  
 Desitge la vacunació en el centre de salut.

Firma:

Data: ...../...../2024

Qualsevol informació relacionada amb l'estat de salut està protegida segons el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril (RGPD), i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia de drets digitals (LOPDGDD), i actualitzacions posteriors. La finalitat d'esta informació és exclusivament per al desenrotllament de la campanya de vacunació. En qualsevol cas, els titulars de la pàtria potestat podran exercir en nom i representació dels menors de catorze anys els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició o qualssevol altres que puguen correspondre'ls en el context de la llei orgànica citada.

## **JUSTIFICANT DE VACUNACIÓ CONTRA LA GRIP EN EL CENTRE DOCENT**

Les vacunes administrades consten des del mateix dia de la vacunació en el seu historial vacunal.  
Si, a més, vosté vol un justificant d'este acte vacunal, marque i ompliga l'apartat següent:

- Sol·licite el justificant de la vacunació de la grip en el centre docent.
- 

## **JUSTIFICANT DE VACUNACIÓ CONTRA LA GRIP EN EL CENTRE DOCENT**

Sr./Sra. \_\_\_\_\_, amb SIP: \_\_\_\_\_

i data de naixement \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ (dia/mes/any)

ha rebut la vacuna Fluenz® (INTRANASAL) contra la grip en el centre docent el dia  
\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Firma de l'equip sanitari:

## **JUSTIFICANTE DE VACUNACIÓN FRENTE A LA GRIPE EN EL CENTRO DOCENTE**

Las vacunas administradas constan desde el mismo día de la vacunación en su Historial vacunal. Si además usted quiere un justificante de este acto vacunal, marque y rellene el siguiente apartado:

Solicito justificante de la vacunación de Gripe en el Centro docente.

---

## **JUSTIFICANTE DE VACUNACIÓN FRENTE A LA GRIPE EN EL CENTRO DOCENTE**

D. /Dña \_\_\_\_\_, con SIP: \_\_\_\_\_

y fecha de nacimiento \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ (día/ mes /año),

ha recibido la vacuna Fluenz® (INTRANASAL) frente a la gripe en el centro docente el día  
\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Firma del equipo sanitario: